




## 沖縄県のHIV・AIDS 最新情報




2007年に32人と最も多かった報告数は、2010年には一旦14人に減少したものの、2011年には再び24人に増加しました。  
2014年11月9日現在の報告数は28人で、2013年の25人を既に上回っています。

2013年新規のHIV・エイズの報告数<沖縄県>  
HIV感染者16人(10万人当たり1.060人) ⇒全国3位  
AIDS患者9人(10万人当たり0.565人) ⇒全国3位  
新規エイズ患者が多いということは、HIVに感染していながら気づいていない人が多いということです。⇒【いきなりエイズ】

## HIV・AIDS 「自分には関係ない」と思っていないですか？

STI(性行為感染症)とは…性行為によって、人から人へうつる感染症のこと。HIVも性感染症のひとつ。  
HIVの感染経路には、「薬物乱用などの注射器の共用」や「母親から子どもへの感染」などがありますが、最も多いのは「性行為による感染」です。そのため、今回は“STIとしてのHIV”について勉強しましょう。



### ★主な性感染症(STI)

病名	どういう病気？	症状は？
性器クラミジア感染症	放置すると、男性は副睾丸炎や前立腺炎、女性は不妊などの原因になる。	多くの場合無症状。 男性:ウミが尿道から出る 女性:おりものの量が増え、黄色っぽくなる
淋菌(りんきん)感染症	女性が放置すると、子宮内膜炎を引き起こす。	男性:排尿時の激しい痛み 女性:黄色っぽいウミがおりものに混ざる
ヒトパピローマウイルス感染症	子宮頸がんや陰茎がん、尖圭(せんけい)コンジローマなどの原因になる。	痛みやかゆみなどはないが、男女とも外性器や肛門周辺などに乳頭状のイボができる
性器ヘルペスウイルス感染症	一度感染すると、ウイルスが体内に潜伏し、再発を起こしやすくなる。	外陰部や陰内に米粒程の水泡ができ、激しい痛みあり キスで唇に水泡
膺カンジダ症	通常でも膺や口の中にいるカビの一種。免疫力低下をきっかけに増加する。	強いかゆみとおりもの
梅毒(ばいどく)	進行すると、様々な症状があらわれ、重大な後遺症を残す。	第I期=性器に小豆大のしこり 第II期=全身に赤い斑点 晩期=心臓・血管・脳などへの障害
ケジラミ	ケジラミというシラミが陰毛の毛根部や周囲の短毛に寄生する。	外陰部に激しいかゆみ、斑点

### ★STIを予防するには…


#### ①NO SEXを!

◆SEXをしなければ、感染の可能性なし!

#### ②SAFER SEX

◆相手を限定する⇒相手が複数だと、感染の確率も高くなる。

◆正しくコンドームを装着する。



コンドームを正しく使っても予防できない病気があります。

#### 予防できる病気

淋病、性器クラミジア感染症、エイズ

#### 予防できない病気

梅毒、ヘルペス、尖圭コンジローマ、かいせん・ケジラミ